

# Kingsman

## Wczesna odmiana o świetnych cechach agronomicznych

Wczesna odmiana jadalna o wysokiej wydajności i tolerancji na wysoką temperaturę oraz suszę, nadająca się do długiego magazynowania. Bulwy w podłużno-owalnym kształcie, o jasnożółtym miąższu. Jasna skórka z płytkimi oczkami. Wyższa zawartość suchej masy (zazwyczaj 22%). Kingsman to wyjątkowo smaczna i pełna walorów żywieniowych, przez co jest doceniana przez konsumentów. Odmiana wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia oraz czarną nóżkę.

	Kingsman
Zawartość suchej masy %	22
Dojrzałość	Wczesna
Parch zwykły (*1)	3
Parch prószysty (*1)	4
Parch srebrzysty (*1)	8
Kształt bulwy	Owalny/ Podłużno- owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Kremowy
Głębokość oczek	Płytke
Gładkość skórki	Gładka
Obicia (*1)	6
Pęknięcia (*1)	9
Przebarwienia skórki (*1)	8
Czarna nóżka (*1)	8
Nicie ziemniaka Ro1 (*2)	9
Nicie ziemniaka Ro2/3 (*2)	2
Wirus liściozwoju (*1)	4
Wirus Y (*1)	-
Zaraza liści	4
Zaraza bulw	5
Sucha zgnilizna ( <i>F. coeruleum</i> ) (*1)	8
Sucha zgnilizna ( <i>F. sulphureum</i> ) (*1)	1

(\*1): - - brak informacji, 9 = odporny, 1 = bardzo podatny



### Charakterystyka

- Kingsman może być sadzony wcześnie w ciepłych glebach, z wyjątkiem miejsc, gdzie występuje wysokie ryzyko parcha prószystego
- Kingsman ma wysoki potencjał plonotwórczy
- Odmiana rozwija dobry i duży system korzeniowy, który zapewnia dobrą wydajność składników odżywczych, jak również Kingsman wykazuje dobrą tolerancję wysokich temperatur i suszy
- Odmiana może dawać wysokie plony bez nawadniania i dobrze radzi sobie w gorących klimatach
- Kingsman utrzymuje silne rośliny aż do pełnej dojrzałości, co może utrudniać zawiązywanie się skórki oraz może opóźniać gromadzenie się suchej masy

## Rekomendowana ilość sadzeniaków

Rozmiar bulw	Przybliżona liczba bulw		Zalecana gęstość bulw na hektar	Ilość sadzeniaków t/ha	W odstępach między rzędami [rzędy 90 cm]
	Na tonę	Na 50 kg			Cm
35x55mm	13500	675	31755	2.35	34.46
25x35mm	39000	1950	58440	1.50	18.72
35x45mm	19900	995	44180	2.22	24.77
45x55mm	10000	500	28254	2.83	38.73

### Ogólne porady, aby uzyskać najlepsze wyniki

- Próby wskazują, że Kingsman jest wrażliwy na metrybuzynę [Sencorex] i uprawy należy opryskiwać tylko przed wschodem, z wyjątkiem upraw uprawianych na piaskach lub bardzo lekkich glebach piaszczystych lub bardzo lekkich, gdzie metrybuzyna nie powinna być stosowana
- Kingsman jest umiarkowanie podatny na parch prószysty i nie jest zalecany do uprawy na polach, na których w przeszłości występował parch prószysty
- Kingsman jest umiarkowanie podatny na parcha zwykłego; zalecane jest nawadnianie w celu zwalczania parcha zwykłego na glebach lekkich
- Kingsman jest odporny na mątwika G. rostochiensis, ale jest podatny na mątwika G. pallida. Potrzeby zwalczania powinny opierać się na analizie gleby
- Aby ułatwić zawiązywanie się skórki i zapewnić optymalny poziom suchej masy, przed desykacją należy upewnić się, że plon starzeje się.

**W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: [www.agriana.pl](http://www.agriana.pl)**

**AGRIANA** 

Agriana Sp. z o.o.  
ul. Główna 9  
82-224 Szymankowo  
NIP: 579-22-53-712  
Tel.: +48 55 271 19 84

Dotożono wszelkich starań, aby rady, informacje, zalecenia i stwierdzenia zawarte w niniejszym opisie były prawdziwe. Agriana Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z ich użytkowania.

